بروكلوربيرازين Prochlorperazine

الأسماء المتداولة : كومبازين (Compazine)

الفئـة : ينتمي عقار بروكلوربيرازين إلى فئة مركبات الفينوثيازين (phenothiazines) ، و يستخدم لدى معالجات السرطان كعقار مانع للغثيان (Antinausea) ، لتجنب أو التخفيف من الغثيان و التقيؤ الناتجين عن تلقي عقاقير العلاج الكيماوي.

الوظائف : يقوم بوقف الرسائل القادمة إلى الجزء الدماغي المسؤول عن الغثيان و التقيؤ..

التناول :

- يتم تلقي عقار بروكلوربيرازين بالحقن الوريدي خلال خمسة دقائق إلى ربع الساعة، أو بالحقن العضلي، أو عن طريق الفم على هيئة أقراص، أو كبسولات بطيئة المفعول، أو على هيئة تحاميل شرجية.
- يمكن تلقي العقار منفردا أو مشتركا مع عقاقير أخرى مانعة للغثيان.
- تعتمد الجرعات على سبب الإستخدام و نوع العقار الكيماوي المستخدم، و مدى نشوء الغثيان و التقيؤ لدى المريض و وتيرة حدوثهما، و مدى فاعلية العقار بجرعات منخفضة.
- ينبغي إتباع تعليمات الطبيب المعالج بدقة عند تناول هذا العقار على هيئة أقراص أو كبسولات أو تحاميل بالبيت، خصوصا توقيت تناول الجرعات، و يمكن تناول الأقراص سواء مع الطعام أو على معدة خاوية مع كأس من الماء أو الشراب.
- يستغرق العقار على هيئة أقراص أو كبسولات ما بين نصف ساعة إلى ساعة ليحقق تأثيره، لذا يوصي بتناول الجرعة قبل ساعة من موعد جرعات العلاج الكيماوي.
- من المعتاد إعطاء الجرعات عن طريق الفم بانتظام مرتين أو ثلاث مرات خلال الأيام الثلاث الأولى لتلقي العلاج الكيماوي ، غير أن ذلك يعتمد على نوع المعالجة المتلقاة و تفاعل الجسم حيالها.
- يتم الاحتفاظ بالدواء في علبة محكمة الإغلاق بعيدا عن مواضع الحرارة و الرطوبة و بعيدا عن متناول الأطفال .

ينبغي إعلام الطبيب المعالج عن المسائل التالية قبل البدء بتلقي العـقار :

- أية عقاقير أخرى قيد التناول، بما في ذلك أقراص الفيتامينات أو خلطات الأعشاب.
- قد تتفاعل الأدوية سواء الموصوفة طبيا أو مما لا تستلزم وصفة طبية مع أدوية أخرى أو مع أنواع الأغذية أو المشروبات، لذا ينبغي استشارة الطبيب حول إمكانية حدوث تفاعل أو تعارض قبل تناول أي دواء جديد.
- ينبغي إعلام الأطباء و أطباء الأسنان و الصيدلانيين عن حالة المريض و تناوله لهذا العقار قبل تلقي أية معالجات من قبلهم.

توصـيات :

- ينبغي إعلام الطبيب المعالج إن طرأ غثيان أو تقيؤ شديدين لم يستجيبا للمعالجة.
- يتسبب هذا العقار في الشعور بالنعاس و ينبغي الحذر من قيادة السيارات أو إدارة الآليات أو الأدوات المنزلية الخطرة أثناء نشوء ذلك، كما ينبغي الإنتباه عند النهوض المفاجئ أو تغيير وضعية البدن أو المشي.
- يتسبب هذا العقار في نشوء اختلاجات حركية و تحركات بدنية غير إرادية و تقلصات عضلية، و تتم معالجة مثل هذه العوارض بتناول عقار داي فينهايدرامين (diphenhydramine) كدواء مصاحب.

التأثيرات الجانبية

على الأرجح لن تظهر أغلب التأثيرات الجانبية المذكورة، و سيقوم الطبيب بتوضيح المضاعفات المتوقعة لدى المريض و إعطاء التوجيهات حول وسائل التعامل معها.

التأثيرات الشائعة :

- الإمساك.
- النعاس.
- السكون.
- جفاف الفم.

التأثيرات غير الشائعة :

- تشوش و ضبابية الرؤية.
- التململ و الضجر.
- اختلاجات و تحركات عضلية لا إرادية.
- الرجفة.
- تزايد الشهية.
- انخفاض ضغط الدم عند تغيير وضعية الجسم.
- زيادة الوزن.
- إرتفاع النبض.
- تغيرات بالنشاطات الكهربية للقلب.

التأثيرات النادرة :

- يرقان و مسحة اصفرار.
- طفح جلدي.
- شري.
- تزايد الحساسية لأشعة الشمس.

مقترحات التعامل مع التأثيرات الجانبية

نوع التأثيرات الجانبية	توصيات
الشعور بالنعاس و الخمول : و ذلك شائع، و ينبغي أن يقل هذا التأثير بعد يوم أو يومين من تناول العقار	• تجنب قيادة السيارات أو إدارة آليات أو أدوات خطرة عند الشعور بالنعاس أو انخفاض التركيز الذهني و الانتباه.
الدوار : قد يطرأ عند الوقوف أو النهوض بسرعة.	• النهوض ببطء، إنزال القدمين عند النهوض من السرير لمدة قصيرة قبل الوقوف. • الإنتباه عند المشي أو نزول الأدراج.
جفاف الفم : قد يطرأ ذلك.	• ترطيب الفم برشفات من السوائل من حين لآخر. • امتصاص قطعة حلوى صلبة أو رقائق المثلجات.
اختلاجات و تقلصات عضلية (خصوصا بعضلات الوجه و الرقبة) :	• تناول أقراص عقار داي فينهايدرامين (diphenhydramine) و أسمه التجاري بينادريل (Benadryl) بجرعات يحددها الطبيب المعالج. • وقف تناول العقار و إعلام الطبيب المعالج بالسرعة الممكنة إن نشأت تقلصات حادة و غير معتادة، ليتم تلقي عقار بينادريل على هيئة حقن.
تشوش و ضبابية الرؤية :	• يمكن استخدام مرطب للعيون (دموع صناعية) بإشراف الطبيب إن نشأ جفاف بالعيون. • تجنب استعمال العدسات اللاصقة أثناء تلقي العقار.
الإمساك : قد يطرأ أحيانا ، و يزول عادة بعد أيام قليلة من التوقف عن تناول العقار.	• القيام بتمارين بدنية إن كان ذلك ممكنا . • تناول الكثير من السوائل. • تناول الأطعمة الغنية بالألياف.

- قد تظهر مضاعفات غير مذكورة لدى بعض الحالات، و ينبغي إعلام الطبيب المعالج عند ظهور أية مشاكل جانبية.

- -