سيبروفلوكساسين Ciprofloxacin

الأسماء المتداولة : سيبرو (Cipro)

الفئـة :
ينتمي عقار سيبروفلوكساسين إلى فئة المضادات الحيوية لمعالجة العدوى و الإنتانات البكتيرية، و يستخدم لدى معالجات السرطان كعقار مساند.

الوظائف :
يكبح إنتاج الحمض النووي للبكتيريا مما يمنعها من النمو و التكاثر، و يستخدم لمعالجة أنواع البكتيريا سالبة و موجبة الجرام، و بعض أنواع البكتيريا المتفطرة (mycobacteria).

التناول :

- يتم تلقي عقار سيبروفلوكساسين عن طريق الفم على هيئة أقراص، أو بالحقن الوريدي خلال فترة نصف ساعة.
- تعتمد الجرعات و تعدادها على نوع العدوى البكتيرية و فاعلية وظائف الكليتين، و من المعتاد تناوله بجرعتين يوميا خلال فترة من سبعة إلى عشرة أيام.
- ينبغي إتباع تعليمات الطبيب المعالج بدقة عند تناول هذا العقار على هيئة أقراص بالبيت، و خصوصا توقيت التناول و ينبغي عدم تفتيت الأقراص، و تناولها كاملة مع كأس كبيرة ممتلئة من الماء قبل ساعة أو بعد ساعتين من تناول الطعام، و تناول الكثير من السوائل خلال اليوم.
- إن كان المريض يتناول مضادات الحموضة، يلزم تناول العقار قبل أو بعد ساعتين من موعد تناول مضاد الحموضة
- ينبغي الاحتفاظ بالدواء في علبة محكمة الإغلاق بعيدا عن مواضع الحرارة و الرطوبة و بعيدا عن متناول الأطفال.

ينبغي إعلام الطبيب المعالج عن المسائل التالية قبل البدء بتلقي العـقار :

- الحمل و الإرضاع، إذ ينبغي عدم تناول هذا العقار من قبل النساء الحوامل و المرضعات.
- إن كان المريض يعاني من أية حساسية تجاه المضادات الحيوية.
- ينبغي إعلام الطبيب المعالج إن كان المريض يتناول عقار ثيوفيلين (Theophylline) الموسع للقصبات الهوائية و المستخدم لمعالجة قصر النفس، حيث قد يزيد السيبروفلوكساسين من معدلاته بالدم، و أحيانا إلى مستويات خطرة.
- أية عقاقير أخرى قيد التناول، بما في ذلك أقراص الفيتامينات أو خلطات الأعشاب.
- قد تتفاعل الأدوية سواء الموصوفة طبيا أو مما لا تستلزم وصفة طبية مع أدوية أخرى أو مع أنواع الأغذية أو المشروبات، لذا ينبغي استشارة الطبيب حول إمكانية حدوث تفاعل أو تعارض قبل تناول أي دواء جديد.
- ينبغي إعلام الأطباء و أطباء الأسنان و الصيدلانيين عن حالة المريض و تناوله لهذا العقار قبل تلقي أية معالجات من قبلهم.

توصـيات :

- قد يتسبب هذا الدواء في نشوء تشوهات بالأجنة، و ينبغي استخدام موانع الحمل من قبل النساء أثناء فترة تناوله.
- ينبغي إستخدام هذا العقار بحذر لدى المرضى ممن يعانون من نوبات صرعية.
- قد تتسبب المضادات الحيوية في نشوء تفاعلات تحسسية، و ينبغي وقف تناول العقار و إعلام الطبيب المعالج في الحال إذا نشأت أعراض التحسس مثل نشوء طفح بالبشرة أو شري أو بثور محمرة، أو طرأت مشاكل تنفسية مثل صعوبة التنفس أو ألآم بالصدر.
- ينبغي وقف تناول العقار و إعلام الطبيب المعالج في الحال عند نشوء طفح بالبشرة أو حمى أو أوجاع بالعضلات أو ظهور دم بالبول، و سيقوم الطبيب بوصف مضاد حيوي آخر.
- ينبغي وقف تناول العقار و إعلام الطبيب المعالج في الحال عند نشوء إسهال متواصل، أو تشنجات معوية أو ظهور دم أو قيح بالبراز، فذلك يستلزم معالجة مستعجلة.
- تتسبب المضادات الحيوية في حدوث تغيرات بالكائنات العضوية العادية بالجسم، و قد تنشأ عدوى فطرية لدى النساء و ينبغي إعلام الطبيب عند نشوء حكاك مهبلي أو خراج.
- ينبغي التقليل من تناول القهوة و السوائل المحتوية على الكافيين أثناء تلقي هذا العقار، إذ أنه يؤخر إطراح الكافيين من الجسم، مما يزيد من وتيرة نشوء بعض التأثيرات الجانبية الممكنة، مثل الصداع و الهلوسة و الدوار و الضجر و النوبات الصرعية، لدى المرضى ممن يتناولون الكثير من الكافيين.
- يمكن لهذا العقار التسبب في نشوء حساسية لأشعة الشمس و إن كان ذلك نادرا، و يمكن أن يتعرض المريض لحروقات شمسية بسهولة، مما يستدعي ضرورة إتخاذ تدابير وقائية عند الخروج أو التعرض للشمس ، مثل ارتداء النظارات الشمسية و تغطية البشرة جيدا، و استخدام الدهانات الواقية من الشمس.

التأثيرات الجانبية

على الأرجح لن تظهر أغلب التأثيرات الجانبية المذكورة، و سيقوم الطبيب بتوضيح المضاعفات المتوقعة و إعطاء التوجيهات حول وسائل التعامل معها.

التأثيرات الشائعة :

- نشوء عدوى فطرية مهبلية.
- حكاك مهبلي.

التأثيرات غير الشائعة :

- الغثيان.
- التقيؤ.
- مغص.
- إسهال.
- فقدان الشهية.
- إرتفاع معدلات وظائف الكليتين بتحاليل الدم.
- تهيج أو التهاب الوريد المستخدم للحقن.

التأثيرات النادرة :

- الصداع.
- الدوار.
- الضجر.
- نوبات صرعية.
- الهلوسة .
- طفح جلدي أو شري.
- الحمى.
- الرجفة.
- إسهال مرتبط بنشوء عدوى ببطانة القنوات المعوية.
- تزايد الحساسية لأشعة الشمس.

- قد تظهر مضاعفات غير مذكورة لدى بعض الحالات، و ينبغي إعلام الطبيب المعالج عند ظهور أية مشاكل جانبية.

- -

منشورات جمعية آدم لسرطـان الطفـولة **http://www.adamcs.org**